

CuPROTE

**Jednozložkové anorganické hnojivo s mikroživinami**

Minerálne hnojivo s obsahom mikroživiny v roztoku 7% Cu

CuPROTE je hnojivo s vysoko vstrebateľným komplexom medi, ktorý sa ako mikroelement vyskytuje v mnohých enzymatických procesoch, najmä pri produkcii fytoalexínov a syntéze lignínu.

U rastlín s nedostatkom medi môže dôjsť k poškodeniu xylémových ciev, čo môže zablokovať transport vody a živín z koreňov do listov.

NEBEZPEČENSTVO

H302: Škodlivý po požití.

H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P264: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P270: Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312: PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára (Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 (0)2 5477 4166).

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501: Zlikvidujte obsah/nádobu do nádob na to určených.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS 07

GHS 05

GHS 09

APLIKÁCIA A DÁVKOVANIEObilniny: PŠENICA, JAČMEŇ, OVOS, TRITIKALE, RAŽ:

Termín aplikácie: od fázy odnožovania do konca fázy klasenia

Odporúčaná dávka: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha

REPKA:

Termín aplikácie: Na jeseň, v štádiu 4-6 listov repky (BBCH 14-16),

na jar po zahájení vegetácie na začiatku fázy predlžovania hlavných výhonkov (BBCH 32-35);

Odporúčaná dávka: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha

KUKURICA:

Termín aplikácie: od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30)

do začiatku kvitnutia kukurice (BBCH 61)

Odporúčaná dávka: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha

CUKROVÁ REPA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 150-300 l/ha

Poznámky: Možná aplikácia s fungicídmi vo fáze prekrytia medziriadkov

ZEMIAK:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 200-500 l/ha.

Aplikujte od začiatku zakrývania medziriadkov až do začiatku žltnutia listov (BBCH 31-91).

Poznámky: Pri silne vyvinutých zemiakových listoch použite vyššiu dávku prípravku.

JABLOŇ:

Na začiatku vegetácie, najneskôr do fázy zeleného púčika (BCH 56):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 400 – 800 l/ha.

Od nasadzovania plodov (BBCH 71) do 21 dní pred zberom:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 800-1000 l/ha.

Poznámky: V závislosti od citlivosti odrody na hnojivá s obsahom medi môže dôjsť k hrdzaveniu plodov

VIŠŇA, ČEREŠŇA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 800-1000 l/ha.

Aplikujte v období kvitnutia (BBCH 59 – 69).

DROBNÉ OVOCIE (JAHODA, MALINA):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte až po vyvinutí dostatočného množstva listov a aplikujte až do konca zberu.

UHORKA (pri pestovaní na poli i v skleníku):

Odporúčaná dávka na jednorazové použitie: 1-3 l/ha

Odporúčané množstvo vody: 700 l/ha.

Dátum použitia: Prípravok používajte podľa potreby vo fázach (BBCH 21 – 89).

PARADAJKA (pri pestovaní na poli i v skleníku), PAPRIKA (pri pestovaní na poli i v skleníku):

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 700 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte ihneď po vysadení rastlín. Ošetrenia opakujte podľa potreby od vývojovej fázy prvých bočných výhonkov (BBCH 21) až do 3 dní pred zberom.

KAPUSTOVÁ ZELENINA:

Odporúčaná dávka na jednorazovú aplikáciu: 1-3 l/ha

Interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte po zakorenení sadeníc. Ošetrenie opakujte podľa potreby, najneskôr do 3 dní pred zberom.

KOREŇOVÁ ZELENINA:

Odporúčaná dávka na jednorazové použitie: 1-3 l/ha

Interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 500-700 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte po rozvinutí 3. listu a pokračujte podľa potreby až do konca vegetačného obdobia.

OSTATNÉ PLODINY:

Odporúčaná dávka na jednorazové použitie: 1-3 l/ha

Minimálny interval medzi ošetreniami: 5-10 dní.

Odporúčané množstvo vody: 200-700 l/ha.

Prvé ošetrenie vykonajte po vytvorení dostatočného množstva listov. Ošetrenie opakujte podľa potreby až do konca vegetácie rastlín.

ĎALŠIE APLIKÁCIE:

Hnojenie: 2-3 l/ha

Pre podrobné odporúčania kontaktujte spoločnosť BELBA PLUS s.r.o. alebo distribútora.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Obsahuje 9% oxidu sírového (SO₃) (= 3,6% S) rozpustného vo vode.

PFC 1(C)(II)(a): Jednozložkové anorganické hnojivo s mikroživinami

Minerálne mikroživinové hnojivo v 7% Cu roztoku.

Deklarovaný obsah zložiek % (m/m):

Mikroživiny sú úplne rozpustné vo vode: 7 % medi (Cu) v komplexe s HGA.

Používajte iba v prípade skutočnej potreby. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Produkt je stabilný v rozsahu pH od 3 do 6.

Zloženie: heptaglukonát sodný (CAS: 31138-65-5)¹, pentahydrát síranu meďnatého (CAS: 7758-99-8)¹, heptaglukonát meďnatý (EC: 946-272-2)¹,

¹CMC 1: Primárne látky a zmesi .

PRÍPRAVA UŽITKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím obsah balenia pretrepte. Naplňte nádrž postrekovača vodou na polovicu jej objemu a zapnite miešadlo. Prípravok pridávajte vždy ako prvú zložku zmesi. Naplňte nádrž postrekovača vodou pri bežiacom miešadle. Výsledný roztok použite na hnojenie.

POZNÁMKY: Pred použitím a aplikáciou komplexných zmesí vykonajte test kompatibility. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené použitím prípravku v rozpore s návodom na použitie.

SKLADOVANIE

Skladujte v pôvodnom obale, na dobre vetranom mieste pri teplote nie nižšej ako 10°C a maximálne 25°C, oddelene od potravín a krmív, mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

PRODUKT URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Doba použiteľnosti - 3 roky

Dátum výroby – uvedené na obale

Číslo šarže - uvedené na obale

Výrobca:

PUH "Chemiroł" sp.

ulica Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

tel. 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

Distribútor SR:

BELBA PLUS s.r.o.

Palánok 4605/5, 949 01, Nitra

info@belbaplus.sk

Balenie: 5L

Hmotnosť netto: 6,3 kg

UN číslo: 3082; LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J. N. síran meďnatý, pentahydrát

Trieda nebezpečenstva pre dopravu: 9;

Obalová skupina III;

Klasifikačný kód: M6;

Identifikačné číslo nebezpečnosti: 90;

Forma: roztok

KOD UFI: 8U20-N0F4-A00M-ND70