

ADIUNKT 500 SC

ADIUNKT 500 SC® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



Prípravok na ochranu rastlín ADIUNKT 500 SC je postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a tritikale.

ÚČINNÁ LÁTKA:

diflufenican 500 g/l

BALENIE:

1 l HDPE fľaša

5 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

ADIUNKT 500 SC je suspenzný koncentrát pre riedenie vodou, ktorý sa používa ako selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom v porastoch obilnín na ochranu proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Účinná látka diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Reziduálny účinok v podmienkach priaznivých pre rast môže trvať až 8 týždňov po aplikácii. Jeho úroveň môže byť znížená na

suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácii, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty. Prípravok je prijímaný hlavne listami a čiastočne koreňmi burín. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú a sfarbia sa do svetlo ružova. Pokračujúcim rastom nadzemných častí sa bledé sfarbenie rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Dávka 0,24 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, vika vtáččia.

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný.

Dávka 0,30 l/ha:

Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka objímavá, nezábudka roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, vika vtáččia.

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, metlička obyčajná, lipkavec obyčajný.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody: 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: max. 1x za vegetačné obdobie

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti.

Prípravok aplikujte na jeseň od rastovej fázy 4 listov do konca do rastovej fázy 3. odnože (BBCH 14-23), podľa rastovej fázy burín. Ošetríte v skorých rastových štádiách

buriny (BBCH 10 – 14). Účinok prípravku podporuje optimálna vlhkosť pôdy.

Prípravok neaplikujte v obilninách s podsevom bôbových rastlín ani na rastliny oslabené alebo poškodené chorobami, škodcami alebo suchom. Pri aplikácii prípravku zabráňte prekryvaniu postrekových pásov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Výsev/výsadba následných plodín je bez obmedzenia. V prípade predčasného zaorania plodiny ošetrenej prípravkom ADIUNKT 500 SC v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, škodcami alebo chorobami, po vykonaní jarnej orby nepestujte cviklu, hrach (na ľahkých pôdach), repku, ovos

ani ostatné kapustovité plodiny. Ostatné plodiny možno pestovať po vykonaní orby do hĺbky 20 cm.

Zabráňte unášaniu postrekovej kvapaliny na susediace porasty a prekryvu ošetrených pásov!

NAŠE ODPORÚČANIE:

Naším hlavným odporúčaním pre prípravok ADIUNKT 500 SC je jeho spoločná aplikácia s prípravkom CEVINO 500 SC (flufenacet). Spoločný tank mix vykazuje široké spektrum účinnosti na trávovité a dvojkľúčolistové buriny s dlhodobou reziduálnou účinnosťou. V mnohých prípadoch po aplikácii uvedeného tank mixu nie je potrebné následné

herbicídne ošetrenie v jarnom období. Pre pozemky bez výskytu trávovitých burín je z hľadiska doplnenia účinnosti (výmrv repky) a ekonomiky ošetrenia vhodným partnerom RASSEL 100 SC (florasulam). Aplikáciu volíme v období od 3. listu obilniny.



Lipkavec obyčajný



Fialka roľná

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
pšenica ozimná, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	0,24 – 0,3 l	AT	
pšenica ozimná, tritikale	dvojkľúčolistové buriny, metlička	0,3 l	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.