

Kombinovaný zásah počas kvitnutia:

Ochrana repky pred patogénmi a škodcami

Porasty naprieč regiónmi vstupujú do **začiatku kvitnutia (BBCH 60–61)**.

Hlavná vetva už kvitne, bočné výhonky sa rozvíjajú. V tomto štádiu sa rozhoduje o množstve a kvalite šesúľ – **ochrana porastu je kritická**

! Hrozby tohto obdobia:

- Biela hniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*), pleseň sivá
- Blyskáčik repkový, krytonos šesúľový
- Stresové podmienky

Odporúčaná technológia ošetrovania:

MOLLIS 450 SC + APIS 200 SE + SWEEP

MOLLIS 450 SC:

- 3 účinné látky:

azoxystrobin 200 g/l, tebuconazole 125 g/l, difenoconazole 125 g/l

- Blyskáčik repkový, krytonos šesúľový
- Stresové podmienky

Dávka: 0,9 - 1,0 l/ha

Aplikácia: od začiatku tvorby kvetných pukov po koniec kvitnutia, začiatok tvorby šesúľ (BBCH 55–69)

Prečo MOLLIS 450 SC?

- ✓ Pokrýva riziko infekcie aj v prípade kolísavého počasia
- ✓ Znižuje stres rastliny a podporuje tvorbu šesúľ
- ✓ Silné systémové pôsobenie – aj pri silnejšom poraste

Insekticídna ochrana - flexibilita podľa situácie

APIS 200 SE (acetamiprid 200 g/l)

Dávka: 0,20 l/ha

SWEEP (cypermethrin 500 g/l)

Dávka: 0,05 l/ha